

MBMD

Inventario conductual de Millon para pacientes con diagnóstico médico

Evaluación de factores psicológicos que pueden influir en el desarrollo de un tratamiento médico en pacientes con enfermedades crónicas.

Autor	T. Millon
Aplicación	Individual o colectiva
Tiempo	De 20 a 30 minutos
Edad	Adultos
Clasificación	C
Adaptación española	Dpto. I+D Pearson Clinical & Talent Assessment - Marzo 2014
Corrección:	Online



Q-global

● Recomendado para

- Pensado para su uso en la práctica clínica, hospitales, consultas externas, centros de salud y estudios de investigación.

● El Juego completo incluye:

- Manual
- Cuadernillo (10 unid.)
- Hoja de respuestas (25 unid.)
- 25 perfiles *online* (Q-global)



Un universo de información en un solo inventario.

Diseñado para evaluar los factores psicológicos que influyen en la evolución y el tratamiento de los pacientes con enfermedades médicas; valorando en profundidad sus actitudes, conductas y características personales.

Test autoaplicado de **165 ítems** con respuestas dicotómicas que cuenta con:

- 29 escalas clínicas
- 3 escalas de patrones de respuesta
- 1 indicador de validez
- 6 indicadores de hábitos de salud negativos

● Organización de las escalas del MBMD en dominios:

DOMINIO	¿QUÉ EVALÚA?
Patrones de respuesta	Patrones de respuesta y conductas problemáticas que alertan al clínico sobre aspectos que merecen una atención especial.
Hábitos negativos de salud	
Indicaciones psiquiátricas	Variables psiquiátricas o psicosociales que influyen en la forma en que los pacientes manejan sus problemas de salud e identifican actitudes que pueden empeorar la evolución de la enfermedad e interferir en el pronóstico global.
Estilos de afrontamiento	
Moderadores del estrés	
Pronósticos de tratamiento	
Guías de tratamiento	

● El MBMD ayuda a:

- Identificar a pacientes que pueden tener importantes problemas psiquiátricos y recomendar intervenciones específicas
- Conocer los aspectos personales y sociales que pueden facilitar el ajuste a las limitaciones físicas o cambios de estilo de vida
- Determinar si los pacientes necesitan más comunicación y apoyo para cumplir con lo prescrito por el médico
- Estructurar planes posteriores al tratamiento y establecer responsabilidades sobre los cuidados personales en el contexto social del paciente