


## BDI-II (\*\*\*)

Inventario de depresión de Beck-II

*Evaluación breve de la existencia y severidad de síntomas depresivos.*

Autor	A. T. Beck, R. A. Steer, G. K. Brown
Aplicación	Individual
Tiempo	De 5 a 10 minutos
Edad	Desde los 17 años
Clasificación	C
Adaptación española	J. Sanz, C. Vázquez y Dpto. I+D Pearson Clinical & Talent Assessment - Noviembre 2011
Corrección	Manual



**Líder mundial. Muestra de población española de más de 2.000 individuos.**

La prueba, que consta de 21 ítems, tiene como objetivo identificar y medir la gravedad de síntomas típicos de la depresión en adultos y adolescentes. Los ítems del BDI-II son consistentes con los criterios recogidos en el DSM-IV para el diagnóstico de los trastornos depresivos.

El BDI-II está adaptado por primera vez a la población española. El manual cuenta con abundante información psicométrica derivada de los estudios realizados con una muestra de más de 2.000 individuos con trastornos psicológicos, población general y estudiantes universitarios.

(\*\*\*) No disponible para Argentina

## BDI-FS

Inventario de depresión de Beck para pacientes médicos

*Instrumento para detectar y evaluar la gravedad de los síntomas depresivos en pacientes médicos.*

Autor	A. T. Beck, R. A. Steer, G. K. Brown
Aplicación	Individual
Tiempo	Menos de 5 minutos
Edad	Desde los 16 años
Clasificación	C
Adaptación española	J. Sanz, A. Izquierdo, M. P. García-Vera y Dpto. I+D Pearson Clinical & Talent Assessment - Noviembre 2011
Corrección	Manual



**Discrimina los síntomas depresivos de los que podrían deberse a otros trastornos o enfermedades.**

Consta de 7 ítems extraídos del BDI-II para evaluar la depresión en adolescentes y adultos con un **diagnóstico médico**, que permiten conocer los síntomas cognitivos y afectivos vinculados a la depresión, excluyendo aquellos que podrían deberse a trastornos o enfermedades médicas.

El BDI-FS se diseñó para reducir el número de falsos positivos de depresión en pacientes cuyos síntomas somáticos o conductuales, atribuibles a trastornos orgánicos o relacionados con el consumo de sustancias, podrían confundir el diagnóstico. La facilidad y brevedad del instrumento lo hacen especialmente adecuado para el cribado de pacientes deprimidos.